



Emsillen®

KINDER-HALSTABLETTEN VANILLE

Zuckerfrei · Homöopathieverträglich

Zweckbestimmung: Lutschtabletten bei Halsschmerzen und Hustenreiz zur Anwendung im Hals- und Rachenraum.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.


Was enthalten Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille?

Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille schmecken nach Vanille, enthalten einen Zuckeraustauschstoff und sind zahnfreundlich.

Eine Tablette enthält:

126 mg Natürliches Emser Salz

(Analysedaten der Ionen in g/kg: Lithium 0,21, Natrium 308,7, Kalium 6,11, Magnesium 0,291, Calcium 0,016, Mangan 0,0001, Eisen (II, III) 0,003, Fluorid 0,078, Chlorid 188,4, Bromid 0,202, Iodid 0,005, Nitrat 0,355, Sulfat 9,24, Hydrogencarbonat 474,4, Carbonat 14,0).



Als Hilfsstoffe sind enthalten: Isomalt, Calciumstearat, Vanille-Aroma, Bourbon-Vanillepulver, Sucralose. Enthält Natrium.

Wann werden Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille angewendet?

Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille sind ein Halsschmerzmittel für Kinder und helfen bei Entzündungen im Hals- und Rachenraum. Sie wirken auf rein natürlicher Basis und befeuchten und reinigen die Rachenschleimhaut. Das unterstützt das körpereigene Immunsystem und lindert Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Hustenreiz.

Wann dürfen Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen sollten Sie Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille nicht anwenden. Kinder, die bestimmte Diäten einhalten sollten, müssen nachfolgende Angaben berücksichtigen: 1 Tablette enthält 1,6 mmol (entspr. ca. 0,04 g) Natrium und ca. 0,00063 mg Iod (als Iodid). Wir bitten den jeweiligen Gehalt bei entsprechenden Diäten zu berücksichtigen.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, wird die Anwendung von Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille in Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Welche Arzneimittel werden in ihrer Wirkung durch Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille beeinflusst?

Eine Beeinflussung von Arzneimitteln ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht bekannt, dennoch sollten Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille nicht unmittelbar mit Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Hinweis zu Arzneimitteln mit homöopathischem Indikationsgebiet:

Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille sind frei von ätherischen Ölen und können im Rahmen homöopathischer Behandlungen unbedenklich angewendet werden.

Wie viel und wie oft sollte Ihr Kind Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille anwenden?

Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille dürfen nur von Kindern angewendet werden, die bereits die Fähigkeit zum kontrollierten Lutschen erworben haben – dies ist meist im Alter von 3 Jahren gegeben. Bei Anzeichen einer Entzündung wie Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Hustenreiz können Kinder bis 6 Jahre je nach Bedarf bis zu 4-mal täglich eine Lutschtablette lutschen oder diese langsam im Mund zergehen lassen. Kinder über 6 Jahre können bis zu 6-mal täglich eine Lutschtablette lutschen oder diese langsam im Mund zergehen lassen.

Lutschtablette nicht zerbeißen!

Wie lange sollte Ihr Kind Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille anwenden?

Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille können unbegrenzte Zeit eingenommen werden. Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Was ist zu tun, wenn Ihr Kind Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille in großen Mengen verschluckt hat?

Bei Einnahme einer größeren Anzahl (mehrere Packungen) Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl und Blähungen, bei Einnahme von 30 Tabletten am Tag und mehr kann es zu Durchfall kommen. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Welche Nebenwirkungen können Emsillen® Kinder-Halstabletten Vanille haben?

Sehr selten können Magenbeschwerden und Blähungen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie Sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Nicht über 30°C aufbewahren.

Die Pastillen vor Licht geschützt im Umkarton aufbewahren.

Was bedeuten die Symbole auf der Packung?

 : Charge

 : Verwendbar bis

 : Gebrauchsanweisung beachten

 : Die Anforderungen der Medizinprodukt-richtlinie werden eingehalten

 : Vor Licht geschützt lagern

 : Nicht über 30°C lagern!

 : Hersteller

Stand der Information: 2020-04


Sidroga Gesellschaft für
Gesundheitsprodukte mbH
Postfach 1262
DE-56119 Bad Ems
www.emser.de
www.emser.at
Tel.: +49 2603 - 9604 710

